

Những điều cần chú ý khi cho trẻ uống thuốc sirô

Viết bởi Administrator

Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 13:44 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:06

Thuốc độnng sirô thườnng dùng trên lâm sàng rất thích hợp cho trẻ em, nhưng nếu không chú ý cũng gây nên những hậu quả xấu đối với trẻ bệnh, cho nên khi dùng thuốc cần chú ý.



Thuốc độnng sirô, cần tuân thủ quy tắc để tránh biến chứng của bệnh.

Khi cho trẻ những thuốc thường gặp khó khăn do trẻ không thích uống, bởi vậy một số thuốc cần phải bào chế dưới dạng sirô có hương thơm khá lớn (80%), một số loại thuốc còn có mùi thơm hoa quả cho trẻ thích uống. Với liều lượng thì tính bằng thìa cà phê (loại thìa rất nhỏ) để cho trẻ uống dễ dàng. Tuy nhiên, khi cho trẻ dùng thuốc cần lưu ý 5 điều sau:

- Thuốc có hàm lượng đường cao, không cho trẻ uống thuốc sát ngay trước bữa ăn, vì chất đường trong thuốc có thể ức chế tiêu hóa. Mặt khác, đường dễ hấp thu rất nhanh, đường trong máu trẻ tăng lên gây “ngang dạ” làm cho trẻ kém ăn.
- Không uống thuốc trước khi đi ngủ, vì đường bám vào răng dễ lên men chua làm hỏng men răng gây sâu răng, sút răng. Nếu cho trẻ uống buổi tối sau đó cần cho trẻ uống nhiều nước, súc miệng kỹ, nếu trẻ lớn có thể đánh răng để tránh tình trạng này.
- Với các loại thuốc bổ máu có chất sắt (Fer.C.B₁₂; Fe-in-sol; Tot-hema; sắt peptonat hòa tan...)

Những điều cần chú ý khi cho trẻ uống thuốc sirô

Viết bởi Administrator

Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 13:44 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:06

khi uống không cho thuốc tiếp xúc trực tiếp với răng vì dễ làm cho răng có màu nâu xỉn. Không cho uống thuốc cùng với sữa bò hoặc uống vào sát thời điểm bú mẹ để tránh tạo thành chất sữa không hòa tan, cần trộn sữa hợp thuốc. Điểm nữa là uống thuốc này phân trẻ sẽ có màu đen, những điều đó không đáng lo. Khi uống thuốc phân trẻ sẽ trở lại màu sắc bình thường.

- Thuốc có vị ngọt lịm có mùi thơm hấp dẫn, nên trẻ rất thích uống. Bởi vậy, cần để thuốc ở nơi cao trẻ không lấy được, nếu không trẻ sẽ lấy thuốc uống dễ gây ra ngộ độc thuốc.

- Khi cho trẻ uống cần theo đúng chỉ dẫn và liều lượng sẽ ghi trên tờ đựng thuốc hợp với từng lứa tuổi của trẻ.

BS. Vũ Hoàng Văn

Theo SKDS