

Đa ối khi mang thai

Viết bởi Administrator


Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 13:44 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:05

Hiện tượng đa ối thường xảy ra ở tuần thai 30 của thai kỳ, bình thường lượng ối chuồng là khoảng 1 lít, nhưng khi nước ối vượt qua mức 2 lít, có nghĩa là thai phụ đang bị đa ối.

Khi nào là đa ối?

Thông thường, thai nhi sẽ nuốt nước ối đi qua cổ họng rồi nhả ra đi tiêu. Đây là cách em bé kiểm soát lượng nước ối quanh mình. Nhưng khi em bé không nuốt nước ối, lượng ối xung quanh có thể tăng nhanh chóng. Và khi lượng ối vượt qua mức 2 lít được gọi là đa ối. Với những trường hợp đa ối nghiêm trọng, lượng ối có thể tới 3 lít, nhiều gấp 3 lần so với chế độ bình thường.

Đa ối thường gây nên các biểu hiện thai nghén như: khó tiêu, nóng, táo bón, phù chân, tĩnh mạch giãn.



Đa ối khi mang thai

Viết bởi Administrator

Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 13:44 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:05

Đa ối là khi bào thai có khối lượng vượt quá 2 lít.

Cách phát hiện

Khoảng 1% bà bầu có khả năng gặp mặt với tình trạng thừa nước ối. Khi vậy, thai phụ xuất hiện những dấu hiệu khó chịu như: gia tăng những cơn đau lưng, sưng đau, phù chân (nhất là ngón chân cái), nhịp tim tăng nhanh, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, táo bón, bí tiểu...

Đa ối cũng sẽ được phát hiện khi thai phụ đi siêu âm. Siêu âm có thể khẳng định chính xác tình trạng thừa ối qua việc đo chỉ số 4 điểm quanh thai nhi để tính chỉ số AFI). Chỉ số thông thường khi nằm ở khoảng 10 - 25cm trong giai đoạn thứ 3 của thai kỳ. Vì thế nếu AFI vượt ngưỡng 25cm nghĩa là đã mắc chứng đa ối. Chỉ số AFI càng cao, tình trạng thừa ối càng nghiêm trọng.

Nguyên nhân gây bệnh

Trong khoảng 2/3 trường hợp đa ối không tìm ra nguyên nhân. Các nguyên nhân khác có thể do:

- Những mắc bệnh đái tháo đường: Tình trạng thừa ối được phát hiện trong 10% thai phụ mắc chứng đái tháo đường, nhất là trong quý 3 của thai kỳ.

- Những mang song thai hoặc đa thai: Tình trạng thừa ối có thể xảy ra do sự trao đổi chất giữa hai bào thai không được cân bằng (một bào thai có ít nước ối trong khi bào thai kia có nhiều nước ối hơn).

Đa  i khi mang thai

Vi t bởi Administrator

Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 13:44 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:05

- Khác thường   bào thai: B  s ng ng qu a tr nh u ng n  c  i -  i ti u, d n t i hi n t  ng th a n  c  i. Tình tr ng này bao g m nh ng d  t t   bào thai nh  h  h m  ch, h p m n v ...

C c y u t  khác làm gia tăng tình tr ng đa  i là: Thi u m u   bào thai; Nhi m trùng bào thai, b t  ng nh m m u gi a m  và b ...

C  th  gây bi n ch ng

Hi n t  ng đa  i c  th  khi n ng  i m  b  v   i s m, d n t i tình tr ng sinh non; T i  i b  c ng s  khi n cho ng i thai b   o l n b t th  ng; C  th  d n   n hi n t  ng chuy n   kéo d i gây khó sinh.

Ngo i ra, đa  i c ng gây  n hi n t  ng c n co t  cung y u, khi n ng  i m  d  b  b ng huyết sau sinh.

Ch nh v  v y, khi c  nh ng bi u hi n c a ch ng đa  i, thai ph   n  i kh m t i c c c  s  y t  chuyên khoa     c ch n  o n, t y v o t ng tr  ng h p c  th  c c b c sĩ s  c  ph  ng  n  i u tr  ph  h p.

B c sĩ B i Th  Ph  ng

Theo SK S